

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) μπορεί να αποτελεί είτε την κύρια αιτία νοσηλείας του ασθενούς στο νοσοκομείο (Κύρια Διάγνωση – PD) είτε να συνυπάρχει ως συννοσηρότητα (Δευτερεύουσα Διάγνωση – SD). Αναλυτικές οδηγίες με παραδείγματα σχετικά με την κωδικοποίηση ασθενών με ΣΔ μπορούν να βρεθούν στην Ειδική Κατευθυντήρια Οδηγία 0401 (βλέπε ΕΚΟΚ σελ. 79).

Αναλόγως του τύπου του ΣΔ, αυτός μπορεί να κωδικοποιηθεί με κάποιον από τους κωδικούς που παρατίθενται στον παρακάτω Πίνακα. Πρέπει να σημειωθεί ότι η θεραπευτική αγωγή με τη χρήση ινσουλίνης δεν υποδηλώνει τον τύπο του ΣΔ και δεν αποδεικνύει ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη.

Τύποι Σακχαρώδη Διαβήτη

Κωδικός ICD-10-GrM	Περιγραφή
E10.-	Ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης [τύπου 1]
E11.-	Μη ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης [τύπου 2]
E12.-	Σακχαρώδης διαβήτης που σχετίζεται με υποσιτισμό
E13.-	Άλλες μορφές σακχαρώδους διαβήτη
E14.-	Μη καθορισμένος σακχαρώδης διαβήτης
O24.-	Σακχαρώδης διαβήτης στην κύηση
P70.0	Σύνδρομο βρέφους της μητέρας με διαβήτη της κύησης
P70.1	Σύνδρομο βρέφους διαβητικής μητέρας
P70.2	Νεογνικός σακχαρώδης διαβήτης
R73.-	Αυξημένα επίπεδα γλυκόζης αίματος

Η κωδικοποίηση των ασθενών με ΣΔ ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες. Γίνεται σύμφωνα με τη λογική της πολλαπλής κωδικοποίησης όπως περιγράφεται στην οδηγία D012 και συγκεκριμένα με το σύστημα «σταυρού-αστερίσκου» (ΕΚΟΚ σελ. 22).

Συνοπτικά, μπορούμε να πούμε ότι στις κωδικοποιήσεις με αυτό το σύστημα χρειάζεται η καταχώρηση ενός κωδικού ICD-10-GrM που αφορά την αιτιολογία (το υποκείμενο αίτιο – εν προκειμένω ο ΣΔ) και επισημαίνεται με σταυρό. Ακολουθείται από έναν κωδικό που αφορά την κλινική εκδήλωση και επισημαίνεται με αστερίσκο.

Σημειώνεται ότι οι κωδικοί που επισημαίνονται με αστερίσκο δε μπορούν να καταχωρηθούν αν δεν προηγείται κωδικός με σταυρό.

Ωστόσο, ειδικά για τον ΣΔ, οι κωδικοί των ομάδων E10-E14 του προηγούμενου πίνακα, εμπεριέχει στο 4^ο ψηφίο πληροφορία για την ύπαρξη ή όχι επιπλοκών (π.χ. κώμα, νεφρικές επιπλοκές κλπ).

Για τις κατηγορίες E10-E14, οι πέμπτοι χαρακτήρες 0-1 προορίζονται για χρήση με τις υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα .2-.6 όπως και .8 και .9 και αντιστοιχούν στον χαρακτηρισμό του ΣΔ ως μη απορρυθμισμένος ή απορρυθμισμένος. Για τις κατηγορίες E10-E14, οι πέμπτοι χαρακτήρες 2-5 μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με την υποκατηγορία τέταρτου χαρακτήρα .7 και αντιστοιχούν στην ύπαρξη ΣΔ με πολλαπλές επιπλοκές και διαβητικού ποδιού (σε ΣΔ που χαρακτηρίζεται ως μη απορρυθμισμένος ή απορρυθμισμένος αντίστοιχα). Οι υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα .0 (κώμα) και .1 (κετοξέωση) θεωρούνται εξ ορισμού απορρυθμισμένες οπότε εκ των πραγμάτων κωδικοποιούνται με τον πέμπτο χαρακτήρα 1.

Η τιμή του σακχάρου αίματος κατά τη στιγμή της εισαγωγής του ασθενούς δεν αποτελεί ένδειξη για τον χαρακτηρισμό του διαβήτη ως «απορρυθμισμένου» ούτε για τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, ούτε για τον τύπου 2. Η καταχώρηση ως «απορρυθμισμένου» ή «μη απορρυθμισμένου» στηρίζεται στην κλινική πορεία του ασθενούς (αναδρομικά). Ο όρος «απορρυθμισμένος» αναφέρεται στη μεταβολική κατάσταση.

Κωδικοποίηση διαβητικού ασθενούς

Το πιο σημαντικό βήμα στην κωδικοποίηση διαβητικού ασθενούς είναι η διαπίστωση αν ο κύριος λόγος νοσηλείας (η Κύρια Διάγνωση) αφορά τη θεραπευτική αντιμετώπιση

1. Του ΣΔ (με μία ή περισσότερες επιπλοκές)
2. Μιας επιπλοκής του ΣΔ
3. Άλλης νόσου με τον ΣΔ ως Δευτερεύουσα Διάγνωση
4. Διαβητικού ποδιού

1. ΣΔ ως Κύρια Διάγνωση

Όταν ο ασθενής έχει ως Κύρια Διάγνωση τον ΣΔ και όχι κάποια επιπλοκή του, εξετάζουμε αν ο ΣΔ έχει ή όχι επιπλοκές και αν είναι απορρυθμισμένος ή όχι. Οι επιπλοκές που κωδικοποιούνται στο 4^ο ψηφίο, δεν οδηγούν σε συγκεκριμένο DRG για τον Σακχαρώδη Διαβήτη.

Έτσι, καταλήγουμε σε 3 κύριες περιπτώσεις με δύο υποπεριπτώσεις κωδικοποίησης

A) ΣΔ χωρίς επιπλοκές που έχει ως κωδικό τον E1x.9- (δηλαδή E10 ως E14)

- i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη καθορισμένο ως απορρυθμισμένο
- ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο ως απορρυθμισμένο

B) ΣΔ με μία επιπλοκή (ανεξαρτήτως ποια) που έχει ως κωδικό τον E1x.6- (δηλαδή E10 ως E14). Η επιπλοκή κωδικοποιείται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσα Διάγνωση όταν απαιτεί τη χρήση επιπλέον πόρων και αντιμετώπιση σύμφωνα με τη D003 της ΕΚΟΚ.

- i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη καθορισμένο ως απορρυθμισμένο
- ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο ως απορρυθμισμένο

Γ) ΣΔ με πολλαπλές επιπλοκές που έχει ως κωδικό τον E1x.7- (δηλαδή E10 ως E14). Η επιπλοκή κωδικοποιείται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσα Διάγνωση όταν απαιτεί τη χρήση επιπλέον πόρων και αντιμετώπιση σύμφωνα με τη D003 της ΕΚΟΚ.

- i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 2 όταν πρόκειται για ΣΔ με άλλες πολλαπλές επιπλοκές μη καθορισμένο ως απορρυθμισμένο
- ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 3 όταν πρόκειται για ΣΔ με άλλες πολλαπλές επιπλοκές καθορισμένο ως απορρυθμισμένο

2. Μια επιπλοκή του ΣΔ ως Κύρια Διάγνωση

Όταν ο ασθενής έχει ως Κύρια Διάγνωση μια επιπλοκή του ΣΔ και όχι τον ίδιο τον ΣΔ, εξετάζουμε ποια είναι η επιπλοκή και αν ο ΣΔ είναι απορρυθμισμένος ή όχι. Για πολλαπλές επιπλοκές, πρέπει να επιλεγεί μία ως κύρια. Μετά τον ορισμό της επιπλοκής του διαβήτη καταχωρείται και η κλινική του εκδήλωση, σύμφωνα με τους

πίνακες κατά σύστημα που υπάρχουν παρακάτω. Οι περιπτώσεις του υπεργλυκαιμικού κώματος (τέταρτο ψηφίο .0) και της κετοξέωσης (τέταρτο ψηφίο 1.) θεωρούνται εξ ορισμού απορρυθμισμένες οπότε εκ των πραγμάτων κωδικοποιούνται με τον πέμπτο χαρακτήρα 1. Οι επιπλοκές που κωδικοποιούνται στο 4^ο ψηφίο, οδηγούν σε συγκεκριμένο DRG που σχετίζεται με το όργανο που επιπλέκεται.

Έτσι, καταλήγουμε σε 8 κύριες περιπτώσεις με δύο υποπεριπτώσεις (πλην του υπεργλυκαιμικού κώματος και της κετοξέωσης) κωδικοποίησης

A) Υπεργλυκαιμικό κώμα που έχει ως κωδικό τον E1x.01 (δηλαδή E10 ως E14)

B) Κετοξέωση που έχει ως κωδικό τον E1x.11 (δηλαδή E10 ως E14).

Γ) Νεφρικές επιπλοκές που έχουν ως κωδικό τον E1x.2- (δηλαδή E10 ως E14). Η επιπλοκή κωδικοποιείται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσα Διάγνωση.

i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη καθορισμένο ως απορρυθμισμένο

ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο ως απορρυθμισμένο

Δ) Οφθαλμικές επιπλοκές που έχουν ως κωδικό τον E1x.3- (δηλαδή E10 ως E14). Η επιπλοκή κωδικοποιείται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσα Διάγνωση.

i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη καθορισμένο ως απορρυθμισμένο

ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο ως απορρυθμισμένο


E) Νευρολογικές επιπλοκές που έχουν ως κωδικό τον E1x.4- (δηλαδή E10 ως E14). Η επιπλοκή κωδικοποιείται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσα Διάγνωση.

i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη καθορισμένο ως απορρυθμισμένο

ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο ως απορρυθμισμένο

ΣΤ) Περιφερικές αγγειακές επιπλοκές που έχουν ως κωδικό τον E1x.5- (δηλαδή E10 ως E14). Η επιπλοκή κωδικοποιείται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσα Διάγνωση.

i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη καθορισμένο ως απορρυθμισμένο



- ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο ως απορρυθμισμένο
- Z) Υπογλυκαιμία/υπογλυκαιμικό κώμα που έχει ως κωδικό τον E1x.6- (δηλαδή E10 ως E14).
 - i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη καθορισμένο ως απορρυθμισμένο
 - ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο ως απορρυθμισμένο
- H) Διαβητική αρθροπάθεια που έχει ως κωδικό τον E1x.6- (δηλαδή E10 ως E14). Η επιπλοκή κωδικοποιείται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσα Διάγνωση.
 - i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη καθορισμένο ως απορρυθμισμένο
 - ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο ως απορρυθμισμένο

3. Άλλη νόσος ως Κύρια Διάγνωση με τον ΣΔ ή επιπλοκή του ως Δευτερεύουσα

Όταν ο ασθενής έχει ως Κύρια Διάγνωση μια άλλη νόσο και όχι τον ίδιο τον ΣΔ ή επιπλοκή του, εξετάζουμε αν ο ΣΔ έχει επιπλοκές και αν είναι απορρυθμισμένος. Οι επιπλοκές του ΣΔ (ως κλινικές εκδηλώσεις) κωδικοποιούνται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσα Διάγνωση όταν απαιτεί τη χρήση επιπλέον πόρων και αντιμετώπιση σύμφωνα με τη D003 της ΕΚΟΚ. Μετά τον ορισμό της επιπλοκής του διαβήτη καταχωρείται και η κλινική του εκδήλωση, σύμφωνα με τους πίνακες κατά σύστημα που υπάρχουν παρακάτω. Οι επιπλοκές κωδικοποιούνται στο 4^ο ψηφίο, ακόμα και αν δεν υπάρχει κατανάλωση πόρων.

Έτσι, καταλήγουμε σε 10 κύριες περιπτώσεις με δύο υποπεριπτώσεις (πλην του υπεργλυκαιμικού κώματος και της κετοξέωσης) κωδικοποίησης

- A) Υπεργλυκαιμικό κώμα που έχει ως κωδικό τον E1x.0- (δηλαδή E10 ως E14)
 - i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη καθορισμένο ως απορρυθμισμένο
 - ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο ως απορρυθμισμένο
- B) Κετοξέωση που έχει ως κωδικό τον E1x.1- (δηλαδή E10 ως E14).



- i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη καθορισμένο ως απορρυθμισμένο
 - ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο ως απορρυθμισμένο
- Γ) Νεφρικές επιπλοκές που έχουν ως κωδικό τον E1x.2- (δηλαδή E10 ως E14). Η επιπλοκή κωδικοποιείται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσα Διάγνωση.
- i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη καθορισμένο ως απορρυθμισμένο
 - ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο ως απορρυθμισμένο
- Δ) Οφθαλμικές επιπλοκές που έχουν ως κωδικό τον E1x.3- (δηλαδή E10 ως E14). Η επιπλοκή κωδικοποιείται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσα Διάγνωση.
- i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη καθορισμένο ως απορρυθμισμένο
 - ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο ως απορρυθμισμένο
- Ε) Νευρολογικές επιπλοκές που έχουν ως κωδικό τον E1x.4- (δηλαδή E10 ως E14). Η επιπλοκή κωδικοποιείται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσα Διάγνωση.
- i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη καθορισμένο ως απορρυθμισμένο
 - ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο ως απορρυθμισμένο
- ΣΤ) Περιφερικές αγγειακές επιπλοκές που έχουν ως κωδικό τον E1x.5- (δηλαδή E10 ως E14). Η επιπλοκή κωδικοποιείται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσα Διάγνωση.
- i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη καθορισμένο ως απορρυθμισμένο
 - ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο ως απορρυθμισμένο
- Ζ) Υπογλυκαιμία/υπογλυκαιμικό κόμα που έχει ως κωδικό τον E1x.6- (δηλαδή E10 ως E14).
- i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη καθορισμένο ως απορρυθμισμένο

- ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο ως απορρυθμισμένο
- H) Διαβητική αρthropάθεια που έχει ως κωδικό τον E1x.6- (δηλαδή E10 ως E14). Η επιπλοκή κωδικοποιείται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσα Διάγνωση.
 - i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη καθορισμένο ως απορρυθμισμένο
 - ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο ως απορρυθμισμένο
- Θ) ΣΔ με πολλαπλές επιπλοκές που έχει ως κωδικό τον E1x.7- (δηλαδή E10 ως E14). Η επιπλοκή κωδικοποιείται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσα Διάγνωση όταν απαιτεί τη χρήση επιπλέον πόρων και αντιμετώπιση σύμφωνα με τη D003 της ΕΚΟΚ.
 - i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 2 όταν πρόκειται για ΣΔ με άλλες πολλαπλές επιπλοκές μη καθορισμένο ως απορρυθμισμένο
 - ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 3 όταν πρόκειται για ΣΔ με άλλες πολλαπλές επιπλοκές καθορισμένο ως απορρυθμισμένο
- I) ΣΔ χωρίς επιπλοκές που έχει ως κωδικό τον E1x.9- (δηλαδή E10 ως E14).
 - i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη καθορισμένο ως απορρυθμισμένο
 - ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο ως απορρυθμισμένο

4. Διαβητικό πόδι

Όταν ο ασθενής έχει νοσηλεύεται για θεραπευτική αντιμετώπιση συνδρόμου διαβητικού ποδιού τότε ως Κύρια Διάγνωση ορίζεται πάντα ο ΣΔ με πολλαπλές επιπλοκές (4^ο ψηφίο .7) και εξετάζουμε αν ο ΣΔ είναι απορρυθμισμένος. Οι επιπλοκές στο σύνδρομο του Διαβητικού Ποδιού ως κλινικές εκδηλώσεις καταχωρούνται σύμφωνα με τον πίνακα που υπάρχει παρακάτω.

Έτσι, καταλήγουμε σε 1 κύρια περίπτωση με δύο υποπεριπτώσεις κωδικοποίησης

- A) ΣΔ με πολλαπλές επιπλοκές που έχει ως κωδικό τον E1x.7- (δηλαδή E10 ως E14). Η επιπλοκή κωδικοποιείται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσα Διάγνωση όταν

απαιτεί τη χρήση επιπλέον πόρων και αντιμετώπιση σύμφωνα με τη D003 της ΕΚΟΚ.

- i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 4 όταν πρόκειται για ΣΔ με διαβητικό πόδι μη καθορισμένο ως απορρυθμισμένο
- ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 5 όταν πρόκειται για ΣΔ με διαβητικό πόδι καθορισμένο ως απορρυθμισμένο

Όλες αυτές οι περιπτώσεις βρίσκονται συγκεντρωμένες και κωδικοποιημένες στον παρακάτω αλγόριθμο



Αλγόριθμος κωδικοποίησης περιστατικού με Σακχαρώδη Διαβήτη

Τύπος Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ)			
E10.- Ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης [τύπου 1]	E11.- Μη ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης [τύπου 2]	E13.- Άλλες μορφές σακχαρώδους διαβήτη	
Κύρια Διάγνωση		Δευτερεύουσα διάγνωση	Διαβητικό πόδι
Ο ΣΔ ως Κύρια Διάγνωση	Μια επιπλοκή ως Κύρια Διάγνωση	Άλλη νόσος ως Κύρια Διάγνωση	
Επιπλοκές	Επιπλοκές	Επιπλοκές	
<p>Πολλαπλές επιπλοκές E1x.7-</p> <p>Μία επιπλοκή (ανεξαρτήτως ποια) E1x.6- (άλλη καθορισμένη επιπλοκή)</p> <p>Χωρίς επιπλοκές E1x.9-</p>	<p>Υπεργλυκαιμικό κόμα E1x.01</p> <p>Κετοξέωση E1x.11</p> <p>Νεφρικές επιπλοκές E1x.2-</p> <p>Οφθαλμικές επιπλοκές E1x.3-</p> <p>Νευρολογικές επιπλοκές E1x.4-</p> <p>Περιφερικές αγγειακές επιπλοκές E1x.5-</p> <p>Υπογλυκαιμία/ υπογλυκαιμικό κόμα E1x.6- (άλλη καθορισμένη επιπλοκή)</p> <p>Διαβητική αρθροπάθεια E1x.6- (άλλη καθορισμένη επιπλοκή)</p> <p>Προσοχή: Για πολλαπλές επιπλοκές, πρέπει να επιλεγθεί μία ως κύρια</p> <p>Σημείωση: Οι επιπλοκές που κωδικοποιούνται στο 4^ο ψηφίο, οδηγούν σε συγκεκριμένο DRG που σχετίζεται με το όργανο που επιπλέκεται</p>	<p>Υπεργλυκαιμικό κόμα E1x.0-</p> <p>Κετοξέωση E1x.1-</p> <p>Νεφρικές επιπλοκές E1x.2-</p> <p>Οφθαλμικές επιπλοκές E1x.3-</p> <p>Νευρολογικές επιπλοκές E1x.4-</p> <p>Περιφερικές αγγειακές επιπλοκές E1x.5-</p> <p>Υπογλυκαιμία/ υπογλυκαιμικό κόμα E1x.6- (άλλη καθορισμένη επιπλοκή)</p> <p>Διαβητική αρθροπάθεια E1x.6- (άλλη καθορισμένη επιπλοκή)</p> <p>Πολλαπλές επιπλοκές E1x.7-</p> <p>Χωρίς επιπλοκές E1x.9-</p> <p>Σημείωση: Ο ΣΔ με επιπλοκές κωδικοποιούνται στο 4^ο ψηφίο, ακόμα και αν δεν υπάρχει κατανάλωση πόρων. Οι επιπλοκές κωδικοποιούνται επιπλέον ως κλινικές εκδηλώσεις όταν υπάρχει κατανάλωση πόρων</p>	<p>Πολλαπλές επιπλοκές E1x.7-</p> <p>Σημείωση: Το σύνδρομο Διαβητικού Ποδιού κωδικοποιείται στο 4^ο ψηφίο πάντα με «πολλαπλές επιπλοκές»</p>
Απορρύθμιση	Απορρύθμιση	Απορρύθμιση	Απορρύθμιση
<p>Με πολλαπλές επιπλοκές E1x.72 Μη απορρυθμισμένος E1x.73 Απορρυθμισμένος</p> <p>Με μία ή χωρίς επιπλοκές E1x.x0 Μη απορρυθμισμένος E1x.x1 Απορρυθμισμένος</p>	<p>E1x.01 Υπεργλυκαιμικό κόμα E1x.11 Κετοξέωση</p> <p>Άλλη (4^ο ψηφίο: 2, 3, 4, 5 ή 6) E1x.x0 Μη απορρυθμισμένος E1x.x1 Απορρυθμισμένος</p>	<p>Με πολλαπλές επιπλοκές E1x.72 Μη απορρυθμισμένος E1x.73 Απορρυθμισμένος</p> <p>Με μία ή χωρίς επιπλοκές E1x.x0 Μη απορρυθμισμένος E1x.x1 Απορρυθμισμένος</p>	<p>E1x.74 Μη απορρυθμισμένος E1x.75 Απορρυθμισμένος</p>

Στους παρακάτω πίνακες αναγράφονται οι κωδικοί ICD-10-GrM όλων των πιθανών επιπλοκών ως κλινικές εκδηλώσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κωδικοποίηση ασθενών με ΣΔ. Υπενθυμίζεται ότι οι επιπλοκές ως κλινικές εκδηλώσεις κωδικοποιούνται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσες Διαγνώσεις όταν απαιτούν τη χρήση επιπλέον πόρων και αντιμετώπιση σύμφωνα με τη D003 της ΕΚΟΚ, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από τις παρούσες οδηγίες.

Νεφρικές επιπλοκές

Κωδικός ICD-10-GrM	Περιγραφή
N08.3*	Σπειραματικές διαταραχές στο σακχαρώδη διαβήτη (E10-E14, με το 2+ στον τέταρτο χαρακτήρα)
N18.1	Χρόνια νεφρική νόσος, 1ου σταδίου
N18.2	Χρόνια νεφρική νόσος, 2ου σταδίου
N18.3	Χρόνια νεφρική νόσος, 3ου σταδίου
N18.4	Χρόνια νεφρική νόσος, 4ου σταδίου
N18.5	Χρόνια νεφρική νόσος, 5ου σταδίου

Οφθαλμικές επιπλοκές

Κωδικός ICD-10-GrM	Περιγραφή
H28.0*	Διαβητικός καταρράκτης (E10-E14 με τέταρτο χαρακτήρα το .3+)
H36.0*	Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (E10-E14, με τέταρτο χαρακτήρα το .3+)
H54.-	Τύφλωση και ελαττωμένη όραση
H35.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές του αμφιβληστροειδούς

Νευρολογικές επιπλοκές

Κωδικός ICD-10-GrM	Περιγραφή
G59.0*	Διαβητική μονονευροπάθεια (E10-E14, με τέταρτο χαρακτήρα .4+)
G63.2*	Διαβητική πολυνευροπάθεια (E10-E14, 5ος χαρακτήρας .4+)
G73.0*	Μυασθενικά σύνδρομα σε ενδοκρινολογικά νοσήματα
G99.0*	Αυτόνομη νευροπάθεια σε ενδοκρινολογικά και μεταβολικά νοσήματα

Περιφερικές αγγειακές επιπλοκές

Κωδικός ICD-10-GrM	Περιγραφή
I79.2*	Περιφερική αγγειοπάθεια σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
I70.2-	Αθηροσκλήρωση των αρτηριών των άκρων

Διαβητική αρθροπάθεια

Κωδικός ICD-10-GrM	Περιγραφή
M14.2-*	Διαβητική αρθροπάθεια (E10-E14, με τέταρτο χαρακτήρα .6+)
M14.6-*	Νευροπαθητική αρθροπάθεια

Άλλες επιπλοκές στο διαβητικό πόδι

Κωδικός ICD-10-GrM	Περιγραφή
L02.4	Δερματικό απόστημα, δοθήνας και ψευδάνθρακας των άκρων
L03.02	Φλέγμονας [κυτταρίτιδα] των δακτύλων του κάτω άκρου
L03.11	Φλέγμονας [κυτταρίτιδα] του κάτω άκρου
L89.-	Έλκος κατάκλισης και πίεσης
L97	Έλκος του κάτω άκρου, που δεν ταξινομείται αλλού
A46	Ερυσίπελας [κυτταρίτιδα]
M20.1	Βλαισός μεγάλος δάκτυλος του ποδός (επίκτητος)
M20.2	Δύσκαμπτος μεγάλος δάκτυλος του ποδός
M20.3	Άλλη (επίκτητη) παραμόρφωση του μεγάλου δακτύλου του ποδός
M20.4	Άλλη σφυροδακτυλία του ποδός (επίκτητη)
M20.5	Άλλες παραμορφώσεις του(ων) δακτύλου(ων) του ποδός (επίκτητες)
M20.6	Επίκτητη παραμόρφωση του(ων) δακτύλου(ων) του ποδός, μη καθορισμένη
M21.-	Άλλες επίκτητες παραμορφώσεις των άκρων
I70.20	Αθηροσκλήρωση των αρτηριών των άκρων: Άλλη και μη καθορισμένη
I70.21	Αθηροσκλήρωση των αρτηριών των άκρων: Λαγονομηριαίος τύπος με ισχαιμικό άλγος που προκαλείται από κόπωση
I70.22	Αθηροσκλήρωση των αρτηριών των άκρων: Λαγονομηριαίος τύπος με άλγος ηρεμίας
I70.23	Αθηροσκλήρωση των αρτηριών των άκρων: Λαγονομηριαίος τύπος με εξέλκωση
I70.24	Αθηροσκλήρωση των αρτηριών των άκρων: Λαγονομηριαίος τύπος με γάγγραινα
Z89.-	Απώλεια άκρου

Άλλοι κωδικοί για ιδιαίτερες νοσολογικές οντότητες

Κωδικός ICD-10-GrM	Περιγραφή
Εγκυμοσύνη	
O24.-	Σακχαρώδης διαβήτης στην κύηση
Νεογνά	
P70.-	Παροδικές διαταραχές του μεταβολισμού των υδατανθράκων ειδικές για το έμβρυο και το νεογνό
Υπερ-/Υπογλυκαιμία χωρίς σακχαρώδη διαβήτη	
E15	Υπογλυκαιμικό κώμα, μη διαβητικό
E16.0	Φαρμακευτικής αιτιολογίας υπογλυκαιμία χωρίς κώμα
E16.1	Υπογλυκαιμία, μη καθορισμένη
E16.2	Αυξημένη έκκριση γλυκαγόνης
E16.9	Διαταραχή της ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατος, μη καθορισμένη
E89.1	Υποϊνσουλιναίμια μετά από ιατρική επέμβαση
R73.0	Παθολογική δοκιμασία ανοχής γλυκόζης
R73.9	Υπεργλυκαιμία, μη καθορισμένη

Σακχαρώδης διαβήτης μετά από ιατρική επέμβαση

Στην περίπτωση σακχαρώδους διαβήτη μετά από ιατρική επέμβαση πρέπει να καταχωρείται αρχικά ένας κωδικός από τους

E13.— Άλλες μορφές σακχαρώδους διαβήτη

Περιλαμβ.: σακχαρώδης διαβήτης σε βλάβη ή αφαίρεση του παγκρέατος

ακολουθούμενος από τον κωδικό

E89.1 Υποϊνσουλιναίμια μετά από ιατρική επέμβαση.

Μεταβολικό σύνδρομο

Σε περίπτωση «μεταβολικού συνδρόμου» πρέπει να καταχωρούνται χωριστά οι επιμέρους διαταραχές (βλέπε επίσης EKOK D004 *Σύνδρομο* (σελίδα 12)).

Διαταραχές της ενδοκρινούς έκκρισης του παγκρέατος

Οι κωδικοί

E16.0 Φαρμακευτικής αιτιολογίας υπογλυκαιμία χωρίς κώμα

E16.1 Άλλες μορφές υπογλυκαιμίας

E16.2 Υπογλυκαιμία, μη καθορισμένη

E16.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές της ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατος

E16.9 Διαταραχή της ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατος, μη καθορισμένη

δεν πρέπει να καταχωρούνται σε **διαβητικούς ασθενείς** ως κύριοι κωδικοί.